



ワクチン名	接種回数	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	1歳	1歳1ヶ月	1歳2ヶ月	1歳3ヶ月	
ロタ(生後6週0日~)	生 2回又は3回		●	●	●												
Hib	不活化 4回 ※注		①	②	③	← 3回目から7ヶ月~1年位あけて →						④					
小児肺炎球菌	不活化 4回 ※注		①	②	③								④	1歳を過ぎてから			
4種混合	不活化 1期4回2期1回*			①	②	③	← 3回目から1年後 →						④				
BCG	生 1回					◎ (5~7ヶ月頃、集団接種)											
B型肝炎	不活化 3回					①	②	← 2回目から半年~1年後 →						③			
MR(麻疹・風疹)	生 1期1回/2期1回*												①				
水痘	生 1~2回													①		抗体検査	
おたふく	生 1~2回													①		(血液型)	
日本脳炎	不活化 1期3回/2期1回*	日本脳炎は一般的には3歳から推奨(海外渡航の方は要)															

- 生 ワクチン：27日以上あける
- 不活化 ワクチン：6日以上あける

※注：Hib,小児用肺炎球菌ワクチン(PCV)は接種開始時が生後6ヶ月以降の場合は、回数が変わります。

※※注：

★MR 2期：5~6歳、日本脳炎 2期：9歳~12歳、DT 2期 11歳~12歳

★子宮頸がんワクチン：中学1年~高校1年生女子

